

CATALOGUE DES TYPES DE GASTÉROPODES MARINS CONSERVÉS  
AU LABORATOIRE DE MALACOLOGIE.

II. TRITONALIA, TYPHIS, TROPHON.

Par E. FISCHER-PIETTE et J. BEIGBEDER<sup>1</sup>.

Genre **Ocinebra** Gray 1847. Voir *Tritonalia*.

Genre **Ocinebrina** Jousseaume 1880. Voir *Tritonalia*.

Genre **Tritonalia** Fleming 1828.

MUREX BICRISTATUS Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 192 (sans figure).

Une coquille, 37 mm. N'a pas été figurée sur les planches inédites de Risso, mais a les dimensions indiquées dans le texte. C'est un *Tritonalia erinaceus* L.

MUREX DOLLFUSI Lamy 1938, *Mém. Inst. Egypte*, XXXVII, p. 54, pl. 1, fig. 1.

Holotype. Long. 8 mm. Provenance : Jubal.

MUREX DUTHIERSI Vélain 1876, C. R. Ac. Sc. 24 juillet, et 1877, *Arch. zool. exp. gén.*, VI, p. 98, pl. 2, fig. 1-2.

Holotype. Long. 8 mm. Ile Saint-Paul.

MUREX ERINACEOIDES Valenciennes 1833, *Coq. univ.* (Voyage Humboldt et Bonpland), p. 302 (sans figure).

Deux syntypes. L'un, de 31 mm. de long, est l'exemplaire que POIRIER a ultérieurement figuré (1882, *Révis. Murex Mus.*, pl. 5, fig. 3) ; l'autre a 23 mm. Provenance : Acapulco.

MUREX EXIGUUS Kiener (non Brod.) 1843, *Spec. Icon. Coq. viv.*, p. 97, pl. 46, fig. 3.

Holotype, provenance « Océanie ». Long. 13 mm., ce qui est la dimension de la figure centrale. La longueur de 20 mm. indiquée dans le texte est erronée, basée sur les deux figures latérales qui n'ont cette dimension que par agrandissement.

1. Pour la façon dont a été conçu ce catalogue, et pour le sens donné aux mots holotype, syntype, paratype, voir le précédent « Bulletin ». Nous rappelons que ce catalogue comporte l'identification des coquilles de SAVIGNY et de Risso.

MUREX FLAVIDUS Jousseau 1874, *Rev. Mag. Zool.*, p. 8, pl. 1, fig. 7-8.

Holotype. Long. 38 mm. Sans provenance.

MUREX FUSIFORMIS Gmelin 1790, *Syst. nat.* éd. XIII, p. 3549.

Espèce fondée uniquement sur « Le Loset » d'Adanson (1757, *Hist. nat. Sénég.*, p. 132 ; pl. 9, fig. 23), dont il existe au Muséum cinq individus (de 14 mm. ; 14 mm. ; 13 mm. ; 12 mm. ; 9 mm.) figurés par E. FISCHER-PIETTE, 1942. Les Moll. d'Adanson, pl. VII, fig. 5, 6 a, 6 b.

MUREX HERMANNI Vélain 1876, *C. R. Ac. Sc.*, 24 juill., et 1877 *Arch. Zool. exp. gén.*, VI, p. 99, pl. 2, fig. 3-4.

Holotype. Long. 7 mm. Ile Saint-Paul.

OCINEBRA MISCOWICHI Pallary 1920 (1912), *Explor. sc. Maroc*, p. 40, pl. 1, fig. 5-6.

Les deux coquilles figurées, l'une de 13 mm. (fig. 5), l'autre de 12 mm. 5 (fig. 6), provenance : Mogador. Et quatre autres exemplaires paratypes, de 13 mm. ; 12,5 mm. ; 10,5 mm ; 10 mm. ; même provenance.

OCINEBRA NUCALIS Locard 1899, Sur les *Ocinebra* des côtes de Fr., *L'Echange, revue linnéenne*, XV, p. 73 (sans figure).

Cette espèce est fondée sur des figures d'autres auteurs et sur la collection LOCARD. Un échantillon du Roussillon (17 mm.) et deux de Marseille (16 et 14 mm.).

MUREX ORBIGNIANUS Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 193 (sans figure).

Une coquille de *Tritonalia erinaceus* L., long. 29,5 mm. Ce n'est pas l'exemplaire représenté sur la planche 43 (inédiée ; voir Th. MONOD, Inventaire manuscrits Risso, *Arch. Muséum*, 6<sup>e</sup> s., VII, 1931).

MUREX PORRECTUS Locard 1886. *Prodr. malac. franç.*, Catal. gén. Moll. Fr., Moll. mar., p. 162 (sans figure).

Cette espèce est fondée sur des figures d'autres auteurs, et sur la collection LOCARD (Roussillon et environs de Nice). Les 13 spécimens de cette collection conservés au Muséum proviennent d'autres localités : Marseille, Cannes, Pietracorbara (Corse), Oran.

OCINEBRA PURPUROIDEA Pallary 1920 (1912), *Explor. sc. Maroc*, p. 39, pl. 1, fig. 16, 17 et 24.

Les deux coquilles figurées, l'une de 15 × 10 mm. (fig. 16), l'autre de 14,5 × 9 mm. (fig. 17 et 24). Provenance : Mogador. Et 6 paratypes, de 14 ; 14 ; 13, 5 ; 13 ; 13 ; 11,5 mm.

OCINEBRA PUSULATA Locard 1886, *Prodr. malac. fr.*, Cat. gén. Moll. viv. Fr., Moll. mar., p. 162 (sans figure).

Holotype, 20 × 11 mm. Marseille.

OCINEBRA REQUIENI Locard 1899, Sur les Ocinebra des côtes de Fr., *L'Echange*, revue linnéenne, XV, p. 72 (sans figure).

Cette espèce est fondée sur un ensemble d'individus de localités très diverses : Hendaye (4 individus actuellement en collection); Saint-Jean-de-Luz (2); Port-Vendres (1); Cette (5); Les Martigues (3); Saint-Henri, Bouches-du-Rhône (3); Marseille (4); Le Mourillon, Var (2); La Seyne (8); Toulon (4); Porquerolles (3); Cap Sicié (1); Cannes (2). La localité de Saint-Tropez est aussi comprise dans la liste de l'auteur, mais sa collection ne renferme actuellement pas d'exemplaires de cette provenance.

MUREX RUDIS Risso 1826, Hist. nat. Eur. mérid., IV, p. 193 (sans figure).

Deux exemplaires. L'un de 18 mm., pourrait être le spécimen représenté sur la planche 43 (inéдите; voir Th. MONOD, Inventaire manuscrits Risso, *Arch. Mus.*, 6<sup>e</sup> s., VII, 1931). L'autre a 11 mm. Ce sont des Tritonalia Blainvillei Payr.

MUREX SUBACICULATUS Locard 1886, Prodr. Malac. fr., Catal. gén. Moll. Fr., Moll. mar., p. 162.

Cette espèce est fondée sur des figures d'autres auteurs, et sur la collection LOCARD. Quatre exemplaires de Toulon et de La Seyne (17; 8; 8; 7,5 mm.).

TRITONALIA (OCINEBRINA) SUGA (Adanson ante *Linneum*) E. Fischer-Piette 1942, Les Mollusques d'Adanson, p. 229, pl. 7, fig. 9-10.

Holotype (long. 11 mm.) et 11 paratypes, toutes ces coquilles provenant d'Adanson.

MUREX TRIQUETRA Risso 1826, Hist. nat. Eur. mérid., IV, p. 195 (sans figure).

Deux exemplaires, l'un de 38 mm., figuré sur la planche 43 (inéдите; voir Th. MONOD, Inventaire manuscrits Risso, *Arch. Mus.*, 6<sup>e</sup> s., VII, 1931), l'autre de 36 mm. Ce sont des Tritonalia erinaceus L.

#### Genre *Typhis* Montfort 1810.

MUREX CLERYI Petit de la Saussaye (*Non* Sowerby) 1842, Magas. Zoologie, pl. 54.

Holotype. Long. 19 mm. Brésil.

MUREX FISTULATUS Risso 1826, Hist. nat. Eur. Mérid., IV, p. 191 (sans figure).

Une coquille, long. 16 mm., qui s'identifie au *Typhis tetrapterus* Bronn. Ce n'est pas l'exemplaire figuré sur la planche 43 (inéдите; ;

voir Th. MONOD, Inventaire manuscrits Risso, *Arch. Muséum*, 6<sup>e</sup> s., VII, 1931), qui présente des tubes remarquablement longs.

Genre **Trophonopsis** Bucq., Dautz. et Dollf., 1882. Voir *Trophon*.

Genre **Trophon** Montfort 1810.

**TROPHON CANDIDATUS** Mabile et Rochebrune 1889, *Miss. Cap Horn*, p. 56, pl. 2, fig. 2.

La coquille figurée. Long. 15 mm. Provenance : Baie Orange.

**TROPHON COSSMANNI** Locard 1897, *Exp. sc. Travailleur Talisman*, I, p. 342, pl. 17, fig. 12-14.

Holotype. Long. 26 mm. Provenance : dragage 99. Et un paratype.

**TROPHONOPSIS CURTA** Locard 1892, *Coq. mar. côtes Fr.*, p. 109 (sans figure). Parmi les 9 exemplaires étiquetés sous ce nom dans la collection Locard, 6 ont les dimensions indiquées dans le texte (8 à 11 mm. de longueur) et peuvent être considérés comme les syntypes de l'espèce. Provenances : Marseille, Toulon, St-Raphaël.

**TROPHON DECORATUS** Locard 1897. *Exp. sc. Travailleur Talisman*, I, p. 340, pl. 17, fig. 5-11.

Holotype. Long., 35 mm. Provenance : Açores. Et le type de la var. *minor*, long. 26 mm.

**TROPHON DEVERSUS** Locard 1897, *Exp. sc. Travailleur Talisman*, I, p. 343, pl. 17, fig. 15-17.

Holotype (Long., 27 mm. canal brisé). Provenance : Açores.

**TROPHON DISPAR** Mabile et Rochebrune 1889, *Miss. Cap Horn*, p. 57, pl. 2, fig. 3.

La coquille figurée. Long., 9 mm. Provenance : Baie Orange.

**FUSUS FASCICULATUS** Hombron et Jacquinet 1854, *Voy. au pôle Sud*, p. 110, pl. 25, fig. 15-16.

Holotype. Long., 22 mm. Provenance : Détroit de Magellan.

**TROPHONOPSIS GRUVELI** Dautzenberg 1910, *Contrib. f. Afr. occ.*, I, p. 60, pl. 2, fig. 9-10.

Holotype. Long., 12 mm. Provenance : Pointe Cansado. Et très nombreux paratypes de petite taille.

**TROPHON LEBRUNI** Mabile et Rochebrune 1889, *Miss. Cap Horn*, p. 55 (sans figure).

Deux échantillons, long., 37 et 33 mm., provenance : Punta-Arena. M. LEBRUN 1883.

FUSUS ROSEUS Hombron et Jacquinot 1854. Voy. au pôle Sud, p. 107, pl. 25, fig. 4-5.

Une coquille, paratype (ou holotype ?), long., 15 mm. Provenance : détroit de Magellan.

FUSUS TEXTILIOSUS Hombron et Jacquinot 1854, Voy. au pôle Sud, p. 108, pl. 25, fig. 9-10.

Holotype. Long., 22,5 mm. Provenance : détroit de Magellan.

MUREX VARIANS d'Orbigny 1839, Voy. Amér. mérid., p. 452, pl. 62, fig. 4-7.

Quatre échantillons de la collection D'ORBIGNY (paratypes ?), mesurant 76 mm. ; 67 mm. ; 66 mm. ; 44 mm.

TROPHON VIOLACEUS Mabile et Rochebrune 1889, Miss. Cap Horn, p. 56, pl. 2, fig. 1.

Holotype. Long., 32 mm. Provenance : Baie Orange.

(A suivre).

Laboratoire de Malacologie du Muséum.